

輪狀病毒疫苗 (Rotarix)

Rotavirus vaccine (Rotarix)

保障您孩子的健康，
帶他們按時接種疫苗。

如果能按時接種所有疫苗，您的孩子就能終身預防許多疾病。

過去五十年間，免疫接種在加拿大挽救的生命比任何醫療手段都要多。

甚麼是輪狀病毒疫苗？

輪狀病毒疫苗可幫助寶寶預防輪狀病毒引起的腹瀉和嘔吐，但無法預防其他病毒引起的類似症狀。疫苗中含有經弱化處理的輪狀病毒。此疫苗已獲加拿大衛生部批准，

輪狀病毒疫苗作為兒童例行免疫項目予以免費接種。請聯絡醫護人員安排接種。

哪些人應接種該疫苗？

嬰兒需要接種兩劑輪狀病毒疫苗，分別在 2 個月和 4 個月大時接種。疫苗是與其他兒童期疫苗一起接種。

請務必按時接種。第一劑疫苗必須在寶寶滿 20 週前接種，第二劑須在寶寶滿 8 個月前接種。接種滿兩劑，疫苗才能發揮最佳保護作用。

請務必保存好所有免疫接種記錄。

如何接種此疫苗？

輪狀病毒疫苗需口服接種，往寶寶口中滴幾滴疫苗吞服即可。

寶寶接種疫苗後至少 10 天內，糞便中仍會帶有疫苗病毒。父母和照顧者為嬰兒換尿布後，應該徹底洗淨雙手。

接種該疫苗有哪些好處？

輪狀病毒疫苗能預防該病毒引起的大約四分之三以上的病例和幾乎全部的嚴重病例，包括需住院醫治的病例。您為孩子接種疫苗的時，也有助保護其他人。

接種該疫苗後可能出現哪些反應？

疫苗非常安全。接種該疫苗遠比寶寶感染輪狀病毒安全得多。

大部分嬰兒接種疫苗後都不會出現任何反應。有些嬰兒在接種疫苗後可能會出現腹瀉、腹痛、脹氣，或皮膚出疹發癢。

嬰兒在接種第一或第二劑輪狀病毒疫苗後的一週內有出現腸套疊（腸道堵塞）的風險，但這種情況極為罕見。每 10 萬名接種了疫苗的嬰兒出現腸套疊的風險為 1 至 2 宗。在卑詩省，這每年最多可能會影響一名嬰兒。相比而言，即使不接種疫苗，每 4,000 名嬰兒中也會有一人發生腸套疊。

腸套疊的症狀包括腹部膨脹、頻頻嘔吐和大便帶血，您的寶寶會顯得虛弱、煩躁，並且會多次厲聲哭啼。如果寶寶出現這些症狀，您應該帶其到最近的急症室求診。

進行任何免疫接種後，都必須在診所內逗留 15 分鐘，因為在非常罕見的情況下可能會出現名為「全身過敏性反應」（anaphylaxis）的可致命反應，這種情況在接種疫苗後的發生概率不到百萬分之一。症狀可能包括蕁麻疹、呼吸困難，以及喉嚨、舌頭或嘴唇腫脹。如果發生這一反應，醫護人員可在現場及時救治。緊急救治包括注射腎上腺素，以及由救護車將您送往就近的醫院急症室。若您在離開診所後出現這些反應，請致電 9-1-1 或當地急救電話。

如有發燒或疼痛，可服用醋氨酚 acetaminophen（例如泰諾 Tylenol®）或布洛芬 ibuprofen*（例如雅維 Advil®）。由於存在雷伊氏綜合症風險，未滿 18 歲者不宜服用乙醯水楊酸 ASA（如阿士匹靈 Aspirin®）。

*在事先沒有與醫護人員討論的情況下，不應該給未滿 6 個月大的嬰兒服用布洛芬。

有關雷伊氏綜合症的更多資訊，請瀏覽 [HealthLinkBC File#84 雷伊氏綜合症](#)。

請謹記，如有任何嚴重或未曾預料到的反應，請告知醫護人員。

哪些人不應接種該疫苗？

如果寶寶出現以下情況，請告知醫護人員：

- 對先前接種的輪狀疫苗或疫苗的任何成分產生危及性命的反應
- 因疾病或藥物治療導致免疫系統功能減弱
- 有免疫系統功能減弱的家族史
- 曾經患有腸套疊或可能導致腸套疊的腸道失調

出現中度或嚴重腹瀉或嘔吐，或患上重病的嬰兒，應該等其康復後再接種疫苗。

您無需因感冒或其它輕微疾病推遲疫苗接種。但您若有疑慮，請與醫護人員商議。

甚麼是輪狀病毒？

輪狀病毒是一種引起腸胃炎（嘔吐及肚瀉），有時又稱腸胃感冒的病毒，是 5 歲以下兒童腹瀉和因腹瀉入院治療的最常見原因。幾乎所有未接種疫苗的兒童在 5 歲之前都會至少感染一次輪狀病毒。

感染輪狀病毒最初的症狀通常是發熱和嘔吐，隨後出現腹瀉及腹痛，症狀通常在感染後 1 至 3 天出現，腹瀉可持續 4 至 8 天。嚴重和頻繁的腹瀉和／或嘔吐會導致幼童脫水。若不治療，可能會導致死亡。

輪狀病毒很容易通過接觸受感染兒童的糞便而傳播，比如在處理尿布時。經常用肥皂及清水洗手，以預防傳播輪狀病毒。此外，出現腹瀉和嘔吐的兒童，不應到日託中心或與其他兒童接觸，直至腹瀉和嘔吐停止滿 48 小時為止。有關洗手的小貼士，請參考 [HealthLinkBC File#85 洗手：防止病菌傳播](#)。



如需查找有關更多話題的 HealthLinkBC 文檔，請前往 www.HealthLinkBC.ca/health-library/healthlinkbc-files，或造訪您當地的公共衛生單位。如需在卑詩省內獲取非緊急健康資訊和建議，請前往 www.HealthLinkBC.ca，或致電 8-1-1（免費電話）。失聰和弱聽人士如需協助，請致電 7-1-1。若您需要，我們亦可提供 130 多種語言的翻譯服務。