

Le vaccin contre le rotavirus (Rotarix)

Rotavirus vaccine (Rotarix)

Protégez votre enfant.

Faites-le vacciner à temps.

S'il est vacciné à temps, votre enfant peut être protégé pour la vie contre de nombreuses maladies.

Au Canada, depuis 50 ans, l'immunisation a sauvé un plus grand nombre de vies que toute autre mesure sanitaire.

Qu'est-ce que le vaccin contre le rotavirus?

Ce vaccin contribue à protéger les bébés contre la diarrhée et les vomissements que provoque le rotavirus. Il ne protège pas contre la diarrhée et les vomissements causés par d'autres virus. Approuvé par Santé Canada, il contient une forme atténuée de rotavirus.

Le vaccin contre le rotavirus est fourni gratuitement dans le cadre des vaccinations systématiques que reçoit votre enfant. Appelez votre fournisseur de soins de santé pour prendre rendez-vous.

Qui devrait recevoir le vaccin?

Les bébés reçoivent ce vaccin en 2 doses, à l'âge de 2 et 4 mois. Il est administré en même temps que les autres vaccins reçus pendant l'enfance.

Il est important de faire vacciner votre bébé contre le rotavirus à temps. La première dose doit être administrée avant l'âge de 20 semaines et la seconde avant 8 mois. Deux doses sont nécessaires pour une protection optimale.

Il est important de conserver des preuves de tous les vaccins reçus.

Comment ce vaccin est-il administré?

Le vaccin contre le rotavirus est administré par voie orale. Quelques gouttes sont placées dans la bouche de votre bébé pour qu'il les avale.

Le virus du vaccin peut se retrouver dans les selles de votre bébé pendant au moins 10 jours après la vaccination. Les parents doivent bien se laver les mains après avoir changé la couche.

Quels sont les avantages du vaccin?

Le vaccin prévient plus de 3 cas d'infection par le rotavirus sur 4 et presque tous les cas graves, y compris ceux nécessitant une hospitalisation. Lorsque votre enfant est vacciné, vous contribuez également à protéger les autres.

Quelles sont les réactions possibles à ce vaccin?

Les vaccins sont très sécuritaires. Il est beaucoup plus sûr pour votre bébé de se faire vacciner que de contracter le rotavirus.

La plupart des bébés ne présentent aucune réaction après avoir reçu le vaccin. Certains peuvent être irritables ou avoir la diarrhée, mal au ventre, des gaz ou une éruption cutanée qui démange.

Il existe un risque très rare d'invagination (occlusion) intestinale dans la semaine suivant la 1^{re} ou la 2^e dose. Ce risque est d'environ 1 ou 2 cas pour 100 000 bébés vaccinés. Au plus, il signifie un bébé par année en Colombie-Britannique. À titre de comparaison, environ 1 enfant de moins d'un an non vacciné sur 4000 contracte chaque année une invagination.

L'invagination se manifeste par l'enflure du ventre, des vomissements fréquents et des selles sanglantes. Votre bébé peut sembler faible et irritable, et avoir plusieurs crises de pleurs intenses. S'il présente ces signes, emmenez-le au service d'urgence le plus proche.

Il faut rester à la clinique pendant 15 minutes après avoir reçu un vaccin. Dans des cas extrêmement rares, une réaction allergique potentiellement fatale nommée anaphylaxie se produit après la vaccination. On l'observe chez moins d'une personne vaccinée sur un million. Les symptômes sont, entre autres, l'urticaire, des difficultés respiratoires ou le gonflement de la gorge, de la langue ou des lèvres. Si elle se produit, votre fournisseur de soins de santé pourra la traiter. Le traitement d'urgence comprend l'administration d'épinéphrine (adrénaline) et le transport par ambulance au service d'urgence le plus proche. Si ces symptômes apparaissent après votre départ de la clinique, composez le 9-1-1 ou le numéro d'urgence de votre région.

De l'acétaminophène (p. ex. du Tylenol®) ou de l'ibuprofène* (p. ex. de l'Advil®) peut être administré pour traiter la fièvre ou la douleur. Il ne faut pas administrer d'AAS (p. ex. de l'aspirine®) aux moins de 18 ans en raison des risques de syndrome de Reye.

*Ne donnez pas d'ibuprofène aux enfants de moins de 6 mois sans en parler d'abord avec votre fournisseur de soins de santé.

Pour en savoir plus sur le syndrome de Reye, consultez la fiche [HealthLinkBC File n° 84 Le syndrome de Reye](#).

Signalez toujours à votre fournisseur de soins de santé toute réaction grave ou inattendue.

À qui le vaccin est-il déconseillé?

Parlez-en à votre fournisseur de soins de santé dans les cas suivants :

- Votre bébé a déjà présenté une réaction potentiellement mortelle à une dose du vaccin contre le rotavirus ou à l'un de ses composants.
- Il a un système immunitaire affaibli par une maladie ou un traitement médical.
- Il présente des antécédents familiaux de système immunitaire affaibli.

- Il a déjà eu une invagination ou souffre d'un trouble intestinal pouvant en causer une.

Les nourrissons souffrant de diarrhée ou de vomissements modérés ou graves, ou d'une maladie grave, ne doivent pas se faire vacciner avant d'être rétablis.

Le rhume ou toute autre maladie bénigne ne devrait pas justifier le report de l'immunisation. Consultez cependant votre fournisseur de soins de santé en cas de doutes.

Qu'est-ce que le rotavirus?

Le rotavirus est un virus qui provoque une gastro-entérite (vomissements et diarrhée), parfois appelée grippe intestinale. C'est la cause la plus commune des diarrhées et des hospitalisations qui s'en suivent chez les enfants de moins de 5 ans. Presque tous les enfants non vaccinés auront au moins une infection à rotavirus avant cet âge.

Les premiers signes d'une infection à rotavirus sont souvent de la fièvre et des vomissements, suivis par de la diarrhée et des maux de ventre. Ils apparaissent de 1 à 3 jours après l'infection. La diarrhée peut durer de 4 à 8 jours. Les jeunes enfants peuvent se déshydrater en cas de diarrhée ou de vomissements graves et fréquents. Si son état n'est pas traité, l'enfant peut mourir.

Le rotavirus se transmet facilement par contact avec les selles d'un enfant infecté. Ce contact peut se produire lors du changement des couches. Lavez-vous souvent les mains à l'eau et au savon pour prévenir la contagion. Un enfant souffrant de diarrhée ou de vomissements ne devrait pas aller en garderie ni être en contact avec d'autres enfants pendant au moins 48 heures après la fin des symptômes. Pour des conseils sur le lavage des mains, consultez la fiche [Dossier HealthLinkBC File n° 85 Le lavage des mains : freinez la propagation des germes](#).



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Pour les autres sujets traités dans les fiches HealthLinkBC, visitez www.HealthLinkBC.ca/health-library/healthlinkbc-files ou votre service de santé publique local. Pour les demandes de renseignements et de conseils sur la santé en C.-B. qui ne constituent pas une urgence, visitez www.HealthLinkBC.ca ou composez le 8-1-1 (sans frais). Les personnes sourdes et malentendantes peuvent obtenir de l'aide en composant le 7-1-1. Des services de traduction sont disponibles sur demande dans plus de 130 langues.