

Vacuna contra el rotavirus (Rotarix)

Rotavirus vaccine (Rotarix)

Proteja a sus hijos.

Vacúnelos a tiempo.

Al recibir todas las vacunas a tiempo, su hijo puede quedar protegido durante toda la vida contra muchas enfermedades.

Las inmunizaciones han salvado más vidas en Canadá en los últimos 50 años que cualquier otra medida sanitaria.

¿Qué es la vacuna contra el rotavirus?

La vacuna contra el rotavirus ayuda a proteger a los bebés contra la diarrea y el vómito causados por un rotavirus. No protege contra la diarrea y el vómito causados por otros virus. Esta vacuna contiene una forma debilitada del rotavirus. La vacuna ha sido aprobada por Health Canada (Ministerio de Salud de Canadá).

La vacuna contra el rotavirus se administra de manera gratuita como parte de las vacunaciones rutinarias de su hijo. Contacte con su proveedor de asistencia sanitaria para concertar una cita.

¿Quién debe recibir la vacuna?

Los bebés reciben la vacuna contra el rotavirus en una serie de dos dosis a los 2 y 4 meses de edad. La vacuna se administra al mismo tiempo que otras vacunas infantiles.

Es importante que los bebés reciban la vacuna contra el rotavirus a tiempo. La primera dosis de la vacuna debe administrarse antes de las 20 semanas de edad y la segunda dosis antes de los 8 meses de edad. Se necesitan las dos dosis de la vacuna para una mejor protección.

Es importante guardar un registro de todas las vacunas recibidas.

¿Cómo se administra la vacuna?

La vacuna contra el rotavirus se administra por vía oral. Se colocan unas gotas de la vacuna en la boca del bebé para que las ingiera.

El virus de la vacuna puede estar presente en las heces del bebé durante al menos 10 días después de la vacunación. Los padres y cuidadores deben lavarse las manos a fondo después de cambiar pañales.

¿Cuáles son los beneficios de la vacuna?

La vacuna previene más de 3 de cada 4 casos de enfermedad por rotavirus, así como casi todos los casos graves, incluyendo hospitalizaciones. Cuando vacuna a su hijo, también ayuda a proteger a los demás.

¿Cuáles son las posibles reacciones después de recibir la vacuna?

Las vacunas son muy seguras. Es mucho más seguro para su bebé recibir la vacuna que contraer una infección por rotavirus.

La mayoría de los bebés no tienen ninguna reacción después de recibir la vacuna. Algunos pueden mostrarse irritables, tener diarrea, dolor de estómago, gases o sarpullido con picazón.

Existe un riesgo muy poco común de intususcepción (obstrucción intestinal, también llamada invaginación intestinal) en la semana posterior a la primera o segunda dosis de la vacuna. El riesgo de intususcepción es de 1 a 2 casos por cada 100.000 bebés vacunados. Como máximo, esto podría afectar a un bebé al año en B.C. En comparación, cada año en B.C. aproximadamente 1 de cada 4.000 niños menores de un año sufren de intususcepción sin haber recibido la vacuna.

Las señales de intususcepción pueden incluir inflamación abdominal, vómito frecuente y heces

con sangre. El bebé puede parecer débil e irritable y tener varios episodios de llanto intenso. Si el bebé presenta estas señales debe llevarlo al servicio de urgencias más cercano.

Es importante permanecer en la clínica durante 15 minutos después de recibir cualquier vacuna, ya que existe una posibilidad extremadamente inusual de tener una reacción alérgica potencialmente mortal llamada anafilaxia. Esto ocurre en menos de una de cada un millón de personas que reciben la vacuna. Los síntomas pueden incluir urticaria, dificultad para respirar, o inflamación de la garganta, lengua o labios. Si esta reacción ocurriera, su proveedor de asistencia sanitaria está preparado para tratarla. El tratamiento de emergencia consiste en la administración de epinefrina (adrenalina) y el traslado en ambulancia al servicio de urgencias más cercano. Si desarrolla síntomas después de haber dejado la clínica, llame al 9-1-1 o al número de emergencia local.

Se puede dar acetaminofén (p. ej. Tylenol®) o ibuprofeno* (p. ej. Advil®) para la fiebre o el dolor. No se debe dar AAS (Aspirina®) a ninguna persona menor de 18 años de edad debido al riesgo del síndrome de Reye.

*No se debe dar ibuprofeno a niños menores de 6 meses de edad sin consultar antes a su proveedor de asistencia sanitaria.

Para obtener más información sobre el síndrome de Reye, vea [HealthLinkBC File #84 Síndrome de Reye](#).

Informe siempre a su proveedor de asistencia sanitaria de cualquier reacción grave o inesperada.

¿Quién no debe recibir la vacuna?

Hable con su proveedor de asistencia sanitaria si su bebé:

- Ha tenido una reacción potencialmente mortal a una dosis anterior de la vacuna contra el rotavirus, o a cualquier componente de la vacuna
- Tiene el sistema inmunitario debilitado por una enfermedad o un tratamiento médico

- Tiene antecedentes familiares de sistema inmunitario debilitado
- Ha tenido intususcepción o tiene un trastorno intestinal que pueda resultar en intususcepción

Los bebés que tengan diarrea o vómito moderado o grave, o una enfermedad grave, no deberían ser vacunados hasta que se hayan recuperado.

No es necesario retrasar la inmunización debido a un resfriado u otra enfermedad leve. Sin embargo, si algo le preocupa, hable con su proveedor de asistencia sanitaria.

¿Qué es el rotavirus?

El rotavirus es un virus que causa gastroenteritis (vómitos y diarrea), a veces llamada gripe estomacal. El rotavirus es la causa más común de diarrea y de hospitalización por diarrea en los niños menores de 5 años de edad. Casi todos los niños que no estén vacunados tendrán al menos una infección por rotavirus antes de cumplir los 5 años de edad.

Los primeros síntomas de una infección por rotavirus son generalmente fiebre y vómito, seguidos de diarrea y dolor de estómago. Estos síntomas aparecen entre 1 y 3 días después de la infección. La diarrea puede durar de 4 a 8 días. La diarrea o vómito grave y frecuente pueden causar deshidratación en los niños pequeños. Si esto no se trata, el niño puede morir.

El rotavirus se transmite fácilmente por el contacto con las heces de un niño infectado. Esto puede ocurrir al manejar los pañales. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón para prevenir la propagación del rotavirus. Un niño enfermo con diarrea o vómito no debería ir a la guardería o tener contacto con otros niños hasta 48 horas después de que la diarrea o el vómito haya parado. Para obtener consejos sobre el lavado de manos, vea [HealthLinkBC File #85 Lavado de manos: ayude a evitar la transmisión de gérmenes](#).



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority

Para leer acerca de otros temas en los folletos de HealthLinkBC, vea www.HealthLinkBC.ca/health-library/healthlinkbc-files o visite su unidad local de Salud Pública. Para obtener información y consejos en temas de salud en B.C. (para casos que no constituyan una emergencia), vea www.HealthLinkBC.ca o llame al número gratuito 8-1-1. El número telefónico de asistencia para personas sordas o con problemas de audición es el 7-1-1. Ofrecemos servicios de traducción (interpretación) en más de 130 idiomas para quienes los soliciten.