

Sífilis Syphilis

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una infección bacteriana. La infección consta de 4 etapas: primaria, secundaria, latente temprana y latente tardía.

¿Cómo se transmite la sífilis?

La sífilis puede transmitirse cuando hay un contacto cercano o sexual con otra persona infectada. La sífilis se transmite a través de:

- Contacto piel con piel con una llaga (lesión) o erupción de sífilis, por contacto externo o interno con la boca, genitales o recto de una persona cuando hay una llaga o una erupción presente
- Intercambio de fluidos corporales, como sangre, semen o flujo vaginal
- Compartir juguetes sexuales
- La sífilis también puede transmitirse al bebé durante el embarazo o el parto. Esto se conoce como sífilis congénita

Aunque cualquiera puede contraer la sífilis, la mayoría de las personas diagnosticadas con sífilis en B.C. son hombres que se identifican como homosexuales, bisexuales, u hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (gbMSM, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los índices recientes de sífilis han aumentado mucho entre las mujeres cisgénero, lo que ha dado lugar a casos de sífilis congénita.

La sífilis puede transmitirse durante cualquiera de las 4 etapas de la infección. El riesgo de tener sífilis es mayor si ya tiene otra infección de transmisión sexual (ITS).

¿Cuáles son los síntomas?

Cada etapa de la sífilis tiene un conjunto de síntomas diferentes. Los síntomas pueden variar o ser tan leves que usted podría no saber que tiene la infección.

Etapas primarias

Durante la etapa primaria, puede formarse una llaga no dolorosa en cualquier parte del cuerpo que haya entrado en contacto con una persona infectada. La llaga generalmente aparece entre 3 y 90 días después de contraer la infección. A menudo, la llaga no será perceptible en el cuerpo. La llaga desaparecerá por sí sola en el transcurso de unas semanas, pero la infección continuará progresando.

Etapas secundarias

La etapa secundaria normalmente comienza entre 14 y 90 días después de contraer la infección. Durante esta etapa podría formarse un sarpullido sin comezón en la piel. La erupción puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero normalmente se encuentra en el pecho, en el abdomen, en los genitales, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Es posible que no note el sarpullido, pero aun así puede infectar a otras personas. Normalmente el sarpullido desaparece pero puede reaparecer meses después. Otros síntomas pueden incluir dolor de cabeza, fiebre, pérdida de cabello, nódulos linfáticos inflamados, y protuberancias o parches de mucosa en el interior de la boca, el ano, el pene o la vagina.

Etapas latentes

Una vez que desaparece el sarpullido, y si no recibe tratamiento, la enfermedad progresará a la etapa latente u oculta. Esta etapa puede durar hasta 30 años o más. Durante este tiempo, es posible que no tenga ningún síntoma.

Hay dos etapas latentes de la sífilis:

- La etapa latente temprana es cuando una persona ha contraído una infección por sífilis en el último año. Las personas que tienen sífilis "temprana" pueden infectar a otros más fácilmente

- Etapa latente tardía es cuando una persona tiene la infección de sífilis por más de un año

Cómo realizarse las pruebas de la sífilis

Visite a su proveedor de asistencia sanitaria para examinar cualquier síntoma de sífilis, como llagas o sarpullidos. Su proveedor de asistencia sanitaria puede derivarle a un laboratorio para que le hagan un análisis de sangre.

Se recomienda que cualquier persona que tenga múltiples parejas sexuales, se realice pruebas de detección de sífilis cada 3 a 6 meses, o de manera inmediata si presenta síntomas.

El cribado de la sífilis en personas embarazadas se realiza de forma rutinaria como parte del cribado inicial y, adicionalmente, en el momento del parto. Si está embarazada, hable con su proveedor de asistencia sanitaria sobre su riesgo de contraer una ITS, incluida la sífilis. Puede ayudarle a determinar si necesita realizarse una prueba de ITS.

Para buscar la clínica de pruebas más cercana en B.C. o para realizar las pruebas en línea, visite "Smart Sex Resource" (Recurso para una sexualidad segura) en <https://smartsexresource.com/sex-talk/talk-about-it> o en "Get Checked Online" (Realizarse una prueba en línea) en <https://getcheckedonline.com>.

¿Cuáles son las complicaciones?

Si la sífilis no se trata, pueden surgir complicaciones en una etapa temprana de la infección o varios años después. Las complicaciones pueden ser neurológicas (pérdida auditiva o de la vista, mareos) o causar daño en el cerebro, en el corazón y en otros órganos del cuerpo, lo que puede causar la muerte.

La sífilis no tratada durante el embarazo puede causar complicaciones graves como un aborto espontáneo, parto prematuro o mortinato, peso bajo al nacer, o causar que el bebé nazca con sífilis.

¿Cuál es el tratamiento?

Durante cualquier etapa, la sífilis puede tratarse con antibióticos. El tratamiento con antibióticos no puede deshacer el daño ya causado por la sífilis en la etapa latente tardía, pero puede prevenir mayores daños. Después del tratamiento, es necesario que se someta a un análisis de sangre para asegurarse de que el tratamiento haya funcionado.

Sus parejas sexuales en los últimos 3 a 12 meses deben someterse a pruebas y a tratamiento para la sífilis. Esto dependerá de la etapa de la sífilis que se le diagnostique a usted. No tenga relaciones sexuales hasta 2 semanas después de que tanto usted como su(s) pareja(s) terminen el tratamiento y se confirme que este fue efectivo.

¿Siguen siendo efectivas mis píldoras anticonceptivas si estoy tomando antibióticos?

Hay muy pocas pruebas que muestren que los antibióticos reduzcan el buen funcionamiento de los métodos anticonceptivos hormonales. Entre los ejemplos de métodos anticonceptivos hormonales se incluyen la píldora, el parche, el anillo o la inyección. Si está recibiendo un tratamiento con antibióticos, es importante que siga usando su método anticonceptivo. Si algo le preocupa, utilice también condones (preservativos) hasta tener su siguiente periodo después de completar el tratamiento con antibióticos, o hable con su proveedor de asistencia sanitaria para obtener más información.

Para más información

Para obtener más información sobre cómo reducir el riesgo de contraer una ITS, consulte [HealthLinkBC File #08o Cómo prevenir las infecciones de transmisión sexual \(ITS\)](#)



BC Centre for Disease Control
Provincial Health Services Authority