

黃熱病疫苗 Yellow fever vaccine

我們建議到部分國家旅行或工作的人士接受旅行防疫接種。請確保在旅行前至少 **6 至 8 週**，就您的旅行計劃詢問公共衛生局、旅行診所或醫護人員。

大多數的旅行疫苗接種均不獲納入省醫療服務計劃（MSP），您應向當地的旅行診所查詢有關費用。

看診時請攜同您的免疫接種記錄。接種旅行疫苗後，您應妥善保存記錄並攜同出發。

甚麼是黃熱病疫苗？

黃熱病疫苗有助預防黃熱病病毒感染。黃熱病是由受感染的病蚊叮咬而傳播的一種病毒性疾病。疫苗已獲加拿大衛生部批准。

哪些人應接種疫苗？

前往非洲熱帶地區或中南美洲旅行或工作的人士，可能需接種該疫苗。請詢問醫護人員或旅行診所瞭解詳情。

如需查閱卑詩省內黃熱病疫苗接種中心名單，請參考加拿大公共衛生局網頁：www.canada.ca/en/public-health/services/travel-health/yellow-fever/vaccination-centres-canada-british-columbia.html。

我們也建議經常接觸黃熱病病毒的工作人員接種疫苗，包括研究人員和實驗室員工。

成人和年滿 **9 個月** 大的兒童可以接種該疫苗，只需接種或注射一劑疫苗。

黃熱病疫苗能夠為 **99%** 的接種人士在 **30 天** 內提供免疫保護。在此之前，切勿動身前往受黃熱病影響的地區。接種一次疫苗足以令您建立起終身的黃熱病免疫力，因此無需接種加強劑。

接種疫苗後，您會收到一份蓋章的《國際疫苗接種或預防證書》（International Certificate of Vaccination or Prophylaxis）。這是一份官方記錄，也是部分國家的法定入境文件。如果您因醫

療原因不能接種黃熱病疫苗，需由醫護人員使用官方信箋出具書面文件，或由旅行診所簽發《接種醫療禁忌證明》（Certificate of Medical Contraindication to Vaccination）。該信件或證書必須說明您不能接種疫苗的醫學原因。

如果沒有證明或醫生發出的書面文件，您可能被目的地國家拒絕入境，或需在目的地國家的入境口岸接種疫苗。

接種疫苗有哪些好處？

黃熱病毒感染是一種嚴重疾病，有時甚至可能致命。接種黃熱病疫苗是預防此疾病的最佳途徑。

接種疫苗後可能出現哪些反應？

疫苗非常安全，接種該疫苗遠比感染黃熱病更安全。對該疫苗的一般反應包括注射部位疼痛和紅腫，也有可能在接種疫苗的 **5 至 10 天** 後出現為期一至兩天的輕微頭痛、低燒或肌肉疼痛等症狀。

如有發燒或疼痛，可服用醋氨酚 acetaminophen（例如泰諾 Tylenol®）或布洛芬 ibuprofen*（例如雅維 Advil®）。不應給未滿 **18 歲** 人士服用乙酰水楊酸 ASA（例如阿司匹林 Aspirin®），因為有造成雷伊氏綜合症（Reye syndrome）的危險。

*在事先沒有與醫護人員討論的情況下，不應該給未滿 **6 個月** 大的嬰兒服用布洛芬。

有關雷伊氏綜合症的更多資訊，請瀏覽 [HealthLinkBC File #84 雷伊氏綜合症](#)。

進行任何免疫接種後，都必須在診所內逗留 **15 分鐘**，因為在非常罕見的情況下可能會出現名為「全身過敏性反應」（anaphylaxis）的可致命反應，這種情況在接種疫苗後的發生概率不到百萬分之一。症狀可能包括蕁麻疹、呼吸困難，以及喉嚨、舌頭或嘴唇腫脹。如果發生這一反應，醫護人員可在現場及時救治。緊急救治包括注射腎上腺素，以及由救護車將您送往就近的醫院急症

室。若您在離開診所後出現這些反應，請致電 **9-1-1** 或當地急救電話。

請謹記，如有任何嚴重或未曾預料到的反應，請告知醫護人員。

哪些人不應接種該疫苗？

以下人士不應接種黃熱病疫苗：

- 未滿 9 個月大的嬰兒
- 年滿 60 歲的人士
- 曾患胸腺疾病或失調症的人士，包括重症肌無力、胸腺瘤、胸腺切除或迪喬治綜合症（DiGeorge syndrome），因為他們在接種疫苗後發生多器官衰竭的風險較高，而目前尚不確知此類風險有多大

假如無法避免旅行，請與醫護人員探討接種黃熱病疫苗的利弊。如果您有或曾出現以下反應或狀況，請詢問醫護人員或旅行診所：

- 曾因接種黃熱病疫苗、或對疫苗中的任何成分（包括明膠）出現過危及性命的過敏反應；黃熱病疫苗**不含**乳膠
- 對蛋嚴重過敏
- 因疾病或藥物治療導致免疫系統功能減退者
- 復發緩解型多發性硬化症（MS），接種黃熱病疫苗也許會使您的病情加重。
- 因受 HIV 病毒感染／愛滋病或其它原因而導致的嚴重的免疫缺陷

- 如遇黃熱病疫情而感染風險很高，您可能會破例被獲接種

甚麼是黃熱病？

黃熱病是種疫苗能預防的病毒型疾病，經由非洲熱帶地區和中南美洲的受感染蚊子叮咬而傳染給人類，加拿大的蚊子不會傳播此疾病。症狀通常在感染後 3 至 6 天出現，

許多人不會出現症狀，但常見的症狀包括發燒、肌肉疼痛、頭痛、食慾不振、噁心或嘔吐。通常在 3 至 4 天內，症狀就會緩解。然而，少數人在看似康復後不久可能會出現更嚴重的中毒階段。此階段的特徵是高燒、黃疸（皮膚和眼睛發黃）、尿色加深、腹痛、嘔吐及可能危及生命的出血。不幸的是，進入這中毒階段的人中約有一半會在 10 至 14 天內死亡。

如需瞭解有關預防蚊子叮咬的更多資訊，請參考 [HealthLinkBC File #41f 瘧疾的預防](#)。

成熟未成年人同意接種疫苗

我們建議家長或監護人與子女先討論是否同意免疫接種。未滿 19 歲的未成年人，如能瞭解接種疫苗的好處、每種疫苗的可能反應，以及不接種疫苗的風險，可以就同意或拒絕免疫接種作出合法決定。若要瞭解更多有關成熟未成年人同意接種疫苗的資訊，請參考

[HealthLinkBC File #119 未成年人法案、成熟未成年人同意書及免疫接種](#)。